



Тварини ендеміки України

Підготувала Герасимич Анастасія



Тваринний світ України налічує:

- Більш як 100 видів ссавців;
- Понад 300 видів птахів;
- 20 видів плазунів;
- 17 видів земноводних;
- 240 видів риб;
- 26 тисяч видів безхребетних.



Сліпак піщаний

Сліпак піщаний — вид підземних гризунів середніх розмірів з родини сліпакові, ендемік півдня України, а саме нижньодніпровського піщаного лісостепу й лук. Основна частина населення перебуває в межах Чорноморського біосферного заповідника. За межами заповідника населення дуже фрагментоване.

Тварини живляться рослинною їжею — об'їдають кореневища, корені, бульби, цибулини.


Розмножується один раз на рік, злягання відбувається в березні, дітонародження у квітні-травні. Самиця народжує 3–4 малят. Період лактації близько місяця. Статевозрілим стає на 2-му році життя.



Ящірка Ліндгольма

Ящірка Ліндгольма — представник роду скельних ящірок родини Справжні ящірки. Загальна довжина досягає 20 см, значну частину складає досить довгий хвіст. Колір шкіри у самців коричнево—бурий, оливково—сірий, а у самиць — зелений. Полюбляють гірсько—степову місцевість, передгір'я, ліси у горах, зустрічається на морському узбережжі. Часто ховаються в ущелинах, серед каміння та у норах гризунів. Гарно пристосовується як до високих, так й низьких температур. Харчується двокрилими, прямокрилими, мурашками, метеликами, жуками, павуками. Це яйцекладні ящірки. Самиця зазвичай відкладає до 5 яєць у червні. Молоді ящірки з'являються у серпні.

Це ендемік України. Зустрічається лише у гірській частині та південному узбережжі Криму. На узбережжі виходить біля Феодосії, Алушти, Судака й Карадагу.



Марена дніпровська

Марéна дніпрóвська — прісноводна риба родини Коропових, ендемік басейнів Дніпра і Південного Бугу. Занесена до Червоної книги України(1994)[1] та до Європейського червоного списку. Поширена в басейні Дніпра та Південного Бугу, де раніше була звичною рибою, а зараз стала рідкісною. Майже зникла у басейні середнього і нижнього Дніпра, у верхній та нижній течії Південного Бугу. Також помічені поодинокі випадки вилову на річках Прут і Дністер. Статевої зрілості самці досягають у 2–3 роки при довжині тіла 15,6 см і масі 92 г, самиці в 3–4 роки при довжині 22 см і масі 195 г. Річкова зграйна риба, що мешкає винятково у проточній, чистій воді; дуже чутлива до нестачі кисню у воді. Надає перевагу порожистим ділянкам і перекатам, місцям з кам'янистим, гальковим, щільним піщаним або глинистим дном. Веде придонний спосіб життя. Дорослі риби споживають суто мешканців дна, зокрема личинок комах, молюсків, червів, а також ікру, молодь і дрібних риб, водорості і вищу рослинність.



Комахи



Красуня блискуча кримська — підвид бабок з родини красуневих. Мешкає в Кримському півострові, гірському Криму та передгір'ї, південному узбережжі. Ендемік.

Самці: крила біля основи та вершини прозорі, посередині з широкою темно-синьою металевою блискучою смугою. Самиці: крила зеленкуваті з металево-зеленим жилкуванням.

Зустрічається біля водойм та берегів гірських водотоків. Ймовірно, має дворічну генерацію. Літ імаго — у травні–червні. Хижак, поїдає дрібних комах. Личинки живляться водяними комахами.



Богомол кримський

Богомол кримський — підвид богомольчика Гельдрейха, його окрема популяція чи рідше окремий вид богомолів, поширений в Криму та на півдні України. Найдрібніший вид богомолів з фауни України. Самиця з вкороченими крилами, самець літає.

Відомий з Криму, Запорізької та Херсонської областей.

Турун Фабра український

Турун Фабра український (лат. *Carabus fabricii ucrainicus* Lazorko, 1951) — ендемічний підвид турунів поширений виключно на території Івано-Франківської області (Україна), у гірському масиві Горгани (Українські Карпати).

На сьогодні у Горганах відомо 11 популяцій цього виду, три з яких у північних, 2 у центральних, а також 6 у південних.

Типовим місцем для Туруна Фабра українського є кам'яні розсипи пісковика з грубоуламковим кам'яним матеріалом на висотах понад 1500 м над рівнем моря. зустрічається на ділянках з Сосно-гірськими і Чорницево-сосно-гірськими фітоасоціаціями.

Живиться різноманітними безхребетними: дрібними червононогими молюсками, кільчастими червами, личинками та імаго комах. Комахи активні вночі та у похмуру погоду, вдень, за звичай, ховаються під каменями та у тріщинах скель. Витримують значні коливання температур: у спекотну погоду кам'яні розсипи високогір'я Горган розігріваються до 35-40 °С, а вночі охолоджуються до 10-15 °С.

Про життєвий цикл нічого невідомо. Ймовірно, що розвиток, як і інших видів роду Турун, триває один рік — навесні личинка виходить з яйця, живиться, росте, линяє, а восени заляльковується.



Сатир евксинський

Сатир евксинський — вид комах з родини Сатири. Єдиний ендемічний представник численного роду у фауні України.

- Розмах крил — 46-58 мм. Візерунок крил самця та самиці майже ідентичний, переважно коричнево-бурого кольору. Обидві пари крил з широкими помаранчево-вохристими смугами та темними жилками на них.
- Мешкає на Кримському півострові (південні схили Ай-Петринської та Ялтинської яйл, північно-східні макросхил Бабуганяйли понад Чучельським перевалом, південні відроги верхнього плато Чатир-Дагу). Загальний відомий ареал виду не перевищує 200 га.
- Стенобіонтний вид. Пристосований до дуже своєрідних біотопів: вапнякових осипів та щебнисто-кам'янистих досить крутих схилів із слабо розвинутим рослинним покривом (проективний покрив до 50 % та нижче). Дає одну генерацію на рік. Літ метеликів триває з кінця червня до середини вересня, активні винятково за сонячної погоди.
- Охороняється у Ялтинському гірськолісовому та Кримському ПЗ.

