

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ
БИОСИНТЕЗА МОЖЕТ БЫТЬ
ПОВЫШЕНА НА 50%**



**СУПЕРИКС В СВИНОВОДСТВЕ
СТИМУЛЯТОР МЕТАБОЛИЗМА**



ТРИ КОМПОНЕНТА СУПЕРИКСА



БУТАФОСФАН



ВИТАМИН В12



ЯНТАРНАЯ
КИСЛОТА



БУТАФОСФАН – КОМПОНЕНТ СУПЕРИКСА

входит состав
костной ткани

стимулирует работу
гладкой и сердечной
мускулатуры, в т. ч.,
репродуктивных путей

ускоряет обмен
глюкозы,
аккумулирует
энергию

нормализует
уровень кортизола
при стрессе

**БУТАФОСФАН-
ОРГАНИЧЕСКИЙ
ФОСФОР**

участвует в
передаче нервных
импульсов

активизирует
работу печени

Энгельгардт В.А.: «Без фосфора нет
движения, ибо химизм мышечных
сокращений - это целиком химия
фосфорных соединений»



ВИТАМИН В₁₂ – КОМПОНЕНТ СУПЕРИКСА

участвует в
синтезе гамма-
глобулинов и
антител

повышает
потребление
кислорода клетками

участвует в синтезе
аминокислот,
нуклеиновых кислот

стимулирует
регенерацию
тканей

**ВИТАМИН В₁₂
-ФАКТОР РОСТА**

участвует в
процессе
кроветворения

предупреждает
жировую
инфильтрацию
печени

*Оказывает анаболическое
действие, так как способствует
синтезу и накоплению белка в
организме*




ОСОБАЯ РОЛЬ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ

ВЫДЕЛЯЕТ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЭНЕРГИИ ПРИ ОКИСЛЕНИИ

СПОСОБНА К ВЫДЕЛЕНИЮ ЭНЕРГИИ В
УСЛОВИЯХ СТРЕССА


СПОСОБНА К РАБОТЕ В
ПАТОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫХ
ТКАНЯХ



ОСОБАЯ РОЛЬ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ



СТАБИЛИЗИРУЕТ МЕМБРАНУ КЛЕТКИ




КОНТРОЛИРУЕТ ДОСТАВКУ КИСЛОРОДА В КЛЕТКУ



УСКОРЯЕТ ПЕРЕДАЧУ НЕРВНЫХ ИМПУЛЬСОВ



СНИЖАЕТ ПРОИЗВОДСТВО ГИСТАМИНА



ОБЛЕГЧАЕТ ГОРМОНАЛЬНУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ СУПОРОСНОСТИ

ТОНИЗИРУЕТ ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

СУПЕРИКС - СТИМУЛЯТОР МЕТАБОЛИЗМА



КАК СТИМУЛЯТОР РОСТА

КАК ГЕПАТОПРОТЕКТОР

КОМПЕНСИРУЕТ ПОТЕРИ
БИОЛОГИЧЕСКИ - АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ ПРИ СТРЕССЕ

ПРИ ИНТОКСИКАЦИЯХ

ДЛЯ АКТИВНОЙ РОДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАК ПРОФИЛАКТИКА ММА

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОСЛЕ ИНФЕКЦИЙ

ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИВОТНЫХ



КОГДА И КАК ПРИМЕНЯТЬ?



СУПЕРИКС В ПЕРИОДЫ СТРЕССОВ:

УСКОРЯЕТ СКОРОСТЬ
БИОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

СТИМУЛИРУЕТ ВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ
СИСТЕМУ

АКТИВИЗИРУЕТ
СИНТЕЗ БЕЛКА

ПОДДЕРЖИВАЕТ АППЕТИТ

ПОВЫШАЕТ
АДАПТИВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ

НОРМАЛИЗУЕТСЯ
УРОВЕНЬ КОРТИЗОЛА

ПОДДЕРЖИВАЕТ
СКОРОСТЬ РОСТА



ДОЗИРОВКА
РАСТУЩИМ ПОРОСЯТАМ:
1,5- 2 мл, в\м, 5-6 дней



СУПЕРИКС В ПЕРИОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:

**УСКОРЯЕТ СКОРОСТЬ
РЕГЕНЕРАЦИИ**

**ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРИЛИВ
ЭНЕРГИИ**

**СНИЖАЕТ
ИНТОКСИКАЦИЮ**

**ОПТИМИЗИРУЕТ СИНТЕЗ
ГАММА-ГЛОБУЛИНОВ И
АНТИТЕЛ**

**ПОДДЕРЖИВАЕТ
ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ**

**ПОДДЕРЖИВАЕТ
СКОРОСТЬ РОСТА**



**ДОЗИРОВКА
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОРОСЯТАМ
ДОРАЩИВАНИЯ:
2- 4 мл, в/м, 5-6 дней**



СУПЕРИКС ПРИ ИНТОКСИКАЦИЯХ:

**НОРМАЛИЗУЕТ
ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ**

**СТИМУЛИРУЕТ
БЕЛКОВЫЙ, УГЛЕВОДНЫЙ
И ЖИРОВОЙ ОБМЕН**



**ОБЕСПЕЧИВАЕТ
БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ ЭНЕРГИЕЙ**

**ВОССТАНАВЛИВАЕТ
КЛЕТКИ ПЕЧЕНИ**

**ВОСПОЛНЯЕТ
ГЛИКОГЕН В ПЕЧЕНИ**

**ДОЗИРОВКА
ПРИ ИНТОКСИКАЦИЯХ :**
5-10 мл, в\м, 5-7 дней



ЗАДАЧИ СУПЕРИКСА ДЛЯ СВИНОМАТОК:

ДАТЬ АНТИОКСИДАНТНУЮ ПОДДЕРЖКУ

СНЯТЬ НАГРУЗКУ С ПЕЧЕНИ

ОБЛЕГЧИТЬ ГОРМОНАЛЬНУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ

ОБЕСПЕЧИТЬ ТОНУС СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ

СНИЖАТЬ УРОВЕНЬ ГИСТАМИНА

ОБЕСПЕЧИТЬ ТОНУС ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ

ДАТЬ ПРИЛИВ ЭНЕРГИИ

ПРОФИЛАКТИРОВАТЬ СИНДРОМ ММА



ДОЗИРОВКА
СВИНОМАТКАМ:

8-10 мл, в\м, 3-5 дней
ИЛИ

две поддерживающих инъекции
до и сразу после опороса

СУПЕРИКС ХРЯКАМ:

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ

ДЛЯ РАБОТЫ СЕРДЦА

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
КОНЕЧНОСТЕЙ

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ФУНКЦИЙ ПЕЧЕНИ



ДЛЯ ОБЩЕГО ТОНУСА
ОРГАНИЗМА

ДОЗИРОВКА ДЛЯ
ХРЯКОВ: 10 мл, в/м, 5
дней подряд, раз в месяц





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

